

RELATÓRIO INFORMATIVO – DIA MUNDIAL CONTRA A AIDS 2018

ESTATÍSTICAS GLOBAIS SOBRE HIV 2017

36,9 milhões [31,1 milhões–43,9 milhões] de pessoas em todo o mundo viviam com HIV em 2017.

21,7 milhões [19,1 milhões–22,6 milhões] de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral em 2017.

1,8 milhão [1,4 milhão–2,4 milhões] de novas infecções pelo HIV em 2017.

940.000 [670.000–1,3 milhão] de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS em 2017.

77,3 milhões [59,9 milhões–100 milhões] de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia.

35,4 milhões [25,0 milhões–49,9 milhões] de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS desde o início da epidemia.

Pessoas vivendo com HIV

- Em 2017, havia 36,9 milhões [31,1 milhões–43,9 milhões] de pessoas vivendo com HIV.
 - 35,1 milhões [29,6 milhões–41,7 milhões] de adultos.
 - 1,8 milhão [1,3 milhão–2,4 milhões] de crianças (menores de 15 anos).
- 75% [55–92%] de todas as pessoas vivendo com HIV conheciam seu estado sorológico.
- Cerca de 9,4 milhões de pessoas não sabem que vivem com HIV.

Pessoas vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral

- Em 2017, 21,7 milhões [19,1 milhões–22,6 milhões] de pessoas vivendo com HIV tinham acesso à terapia antirretroviral, um aumento dos 8 milhões [7,1 milhões–8,3 milhões] em 2010.
- 59% [44–73%] de todas as pessoas vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento.
 - 59% [44–73%] dos adultos com 15 ou mais anos vivendo com HIV tinham acesso ao tratamento, assim como 52% [37–70%] das crianças de 0 a 14 anos.
 - 65% [49–80%] das mulheres com idade igual ou superior a 15 anos tiveram acesso ao tratamento de HIV, mas apenas 53% [38–66%] dos adultos do sexo masculino com 15 anos ou mais tiveram acesso ao tratamento.
- Em 2017, 80% [61–>95%] das mulheres grávidas vivendo com HIV tinham acesso a medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão do HIV para seus bebês.

Novas infecções por HIV

- O número de novas infecções por HIV caiu 47% desde o pico em 1996.
 - Em 2017, houve 1,8 milhão [1,4 milhão–2,4 milhões] de novas infecções por HIV, em comparação com 3,4 milhões [2,6 milhões–4,4 milhões] em 1996.
- Desde 2010, as novas infecções por HIV entre adultos caíram cerca de 16%, de 1,9 milhão [1,5 milhão–2,5 milhões] para 1,6 milhão [1,3 milhão–2,1 milhões] em 2017.
 - Desde 2010, as novas infecções por HIV entre crianças diminuíram 35%, de 270.000 [170.000–400.000] em 2010 para 180.000 [110.000–260.000] em 2017.

Mortes relacionadas à AIDS

- As mortes relacionadas à AIDS caíram mais de 51% desde o pico em 2004.
 - Em 2017, aproximadamente 940.000 [670.000–1,3 milhão] de pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS em todo o mundo, em comparação com 1,9 milhão [1,4 milhão–2,7 milhões] em 2004 e 1,4 milhão [1 milhão–2 milhões] em 2010.

90–90–90

- Em 2017, três em cada quatro pessoas vivendo com HIV (75%) conheciam seu estado sorológico para o HIV (foram testadas para HIV).
- Entre as pessoas que conheciam seu estado sorológico, quatro a cada cinco (79%) tinham acesso ao tratamento antirretroviral.
- Entre as pessoas com acesso ao tratamento, quatro a cada cinco (81%) tinham carga viral suprimida.
- 47% de todas as pessoas vivendo com HIV têm a carga viral suprimida.

Mulheres

- Todas as semanas, cerca de 7.000 mulheres jovens entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV.
 - Na África Subsaariana, três a cada quatro novas infecções são entre meninas com idade entre 15 e 19 anos. Mulheres jovens entre 15 e 24 anos têm o dobro de probabilidade de estarem vivendo com HIV do que homens.
- Mais de um terço (35%) das mulheres em todo o mundo sofreram violência física e/ou sexual em algum momento de suas vidas.
 - Em algumas regiões, as mulheres que sofrem violência são 1,5 vez mais suscetíveis a se infectarem pelo HIV.

Populações-chave

- Populações-chave e seus parceiros sexuais representam:
 - 47% das novas infecções pelo HIV em todo o mundo.
 - 95% das novas infecções pelo HIV no Leste Europeu e Ásia Central e no Oriente Médio e Norte da África.
 - 16% das novas infecções pelo HIV na África Oriental e Austral.

- O risco de infecção pelo é:
 - 27 vezes maior entre homens que fazem sexo com homens.
 - 23 vezes maior entre pessoas que usam drogas injetáveis.
 - 13 vezes maior entre profissionais do sexo.
 - 13 vezes maior entre mulheres trans.

HIV/Tuberculose (TB)

- A tuberculose continua a ser a principal causa de morte entre pessoas vivendo com HIV, e é responsável por cerca de uma a cada três mortes relacionadas à AIDS.
- Em 2016, 10,4 milhões de pessoas desenvolveram TB, incluindo 1,2 milhão de pessoas vivendo com HIV.
 - Pessoas vivendo com HIV sem sintomas de TB precisam de terapia preventiva contra TB, que contribui para diminuir o risco de desenvolver TB e reduz as taxas de mortalidade por TB/HIV em cerca de 40%.
- Estima-se que 49% das pessoas que vivem com HIV e tuberculose desconhecem sua coinfeção e, portanto, não estão recebendo cuidados.

Investimentos

- No final de 2017, US\$ 21,3 bilhões estavam disponíveis para a resposta à AIDS em países de baixa e média renda.
 - Os recursos domésticos constituíram cerca de 56% dos recursos totais para o HIV em países de baixa e média renda em 2017.
- O UNAIDS estima que será necessário um investimento de US\$ 26,2 bilhões para a resposta à AIDS até 2020.

Dados Globais

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoas vivendo com HIV	27,4 milhões [23,1 milhões– 32,6 milhões]	30,1 milhões [25,4 milhões– 35,8 milhões]	32,4 milhões [27,4 milhões– 38,5 milhões]	33,7 milhões [28,4 milhões– 40,0 milhões]	34,3 milhões [29,0 milhões– 40,8 milhões]	35,0 milhões [29,5 milhões– 41,6 milhões]	35,6 milhões [30,1 milhões– 42,4 milhões]	36,3 milhões [30,6 milhões– 43,1 milhões]	36,9 milhões [31,1 milhões– 43,9 milhões]
Novas infecções por HIV (total)	2,8 milhões [2,2 milhão– 3,7 milhões]	2,5 milhões [1,9 milhão– 3,2 milhões]	2,2 milhões [1,7 milhão– 2,9 milhões]	2,1 milhões [1,6 milhão– 2,7 milhões]	2,0 milhões [1,6 milhão– 2,7 milhões]	2,0 milhões [1,5 milhão– 2,6 milhões]	1,9 milhão [1,5 milhão– 2,5 milhões]	1,9 milhão [1,4 milhão– 2,4 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão– 2,4 milhões]
Novas infecções por HIV (com idade 15+)	2,4 milhões [1,9 milhão– 3,2 milhões]	2,1 milhões [1,6 milhão– 2,7 milhões]	1,9 milhão [1,5 milhão– 2,5 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão– 2,4 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão– 2,4 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão– 2,3 milhões]	1,7 milhão [1,3 milhão– 2,3 milhões]	1,7 milhão [1,3 milhão– 2,2 milhões]	1,6 milhão [1,3 milhão– 2,1 milhões]
Novas infecções por HIV (com idade 0–14)	420 000 [260 000– 620 000]	380 000 [240 000– 560 000]	270 000 [170 000– 400 000]	230 000 [150 000– 340 000]	220 000 [140 000– 320 000]	200 000 [120 000– 290 000]	190 000 [120 000– 280 000]	180 000 [110 000– 270 000]	180 000 [110 000– 260 000]
Mortes relacionadas à AIDS	1,5 milhão [1,1 milhão– 2,2 milhões]	1,9 milhão [1,4 milhão– 2,7 milhões]	1,4 milhão [1,0 milhão– 2,0 milhões]	1,2 milhão [880 000– 1,7 milhão]	1,2 milhão [820 000– 1,6 milhão]	1,1 milhão [770 000– 1,5 milhão]	1,0 milhão [730 000– 1,5 milhão]	990 000 [700 000– 1,4 milhão]	940 000 [670 000– 1,3 milhão]
Pessoas com acesso à terapia antirretroviral	611 000 [538 000– 636 000]	2,1 milhões [1,8 milhão– 2,1 milhões]	8,0 milhões [7,1 milhões– 8,3 milhões]	11,4 milhões [10,1 milhões– 11,9 milhões]	13,2 milhões [11,6 milhões– 13,8 milhões]	15,1 milhões [13,3 milhões– 15,7 milhões]	17,2 milhões [15,2 milhões– 17,9 milhões]	19,4 milhões [17,1 milhões– 20,2 milhões]	21,7 milhões [19,1 milhões– 22,6 milhões]
Recursos disponíveis para HIV (países de baixa - e média - renda)	US\$ 4,8 bilhões*	US\$ 9,4 bilhões*	US\$ 15,9 bilhões*	US\$ 18,8 bilhões*	US\$ 19,5 bilhões**	US\$ 19,2 bilhões**	US\$ 19,0 bilhões**	US\$ 19,1 bilhões**	US\$ 21,3 bilhões**

* Inclui países classificados como baixa - e média - renda pelo Banco Mundial na classificação de 2012.

** Inclui países de baixa - e média - renda pelo Banco Mundial na classificação de 2013.

Dados Regionais—2017

Região	Pessoas vivendo com HIV 2017	Novas infecções 2017			Mortes relacionadas à AIDS 2017	Pessoas com acesso ao tratamento 2017
		Total	Idade 15+	Idade 0–14		
África Oriental e Austral	19,6 milhões [17,5 milhões–22,0 milhões]	800 000 [650 000–1,0 milhão]	710 000 [580 000–890 000]	92 000 [61 000–130 000]	380 000 [300 000–510 000]	12,9 milhões [11,4 milhões–13,4 milhões]
Ásia e Pacífico	5,2 milhões [4,1 milhões–6,7 milhões]	280 000 [210 000–390 000]	280 000 [210 000–390 000]	10 000 [7 400–14 000]	170 000 [110 000–280 000]	2,7 milhões [2,4 milhões–2,9 milhões]
África Ocidental e Central	6,1 milhões [4,4 milhões–8,1 milhões]	370 000 [220 000–570 000]	310 000 [180 000–470 000]	67 000 [36 000–100 000]	280 000 [180 000–410 000]	2,4 milhões [2,1 milhões–2,5 milhões]
América Latina	1,8 milhão [1,5 milhão–2,3 milhões]	100 000 [77 000–130 000]	99 000 [75 000–130 000]	2400 [1800–3600]	37 000 [26 000–51 000]	1,1 milhão [992 000–1,2 milhão]
Caribe	310 000 [260 000–420 000]	15 000 [11 000–26 000]	14 000 [10 000–24 000]	1100 [710–1 900]	10 000 [7 100–17 000]	181 000 [159 000–188 000]
Oriente Médio e Norte da África	220 000 [150 000–300 000]	18 000 [10 000–31 000]	17 000 [9 200–28 000]	1 300 [780–1 900]	9 800 [6 400–15 000]	63 200 [55 600–65 700]
Leste Europeu e Ásia Central	1,4 milhão [1,3 milhão–1,6 milhão]	130 000 [120 000–150 000]	130 000 [120 000–150 000]	—*	34 000 [25 000–41 000]	520 000 [458 000–541 000]
Europa Ocidental e Central e América do Norte	2,2 milhões [1,9 milhão–2,4 milhões]	70 000 [57 000–84 000]	69 000 [57 000–83 000]	—*	13 000 [9 900–18 000]	1,7 milhão [1,5 milhão–1,8 milhão]
Total Global	36,9 milhões [31,1 milhões–43,9 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão–2,4 milhões]	1,6 milhão [1,3 milhão–2,1 milhão]	180 000 [110 000–260 000]	940 000 [670 000–1,3 milhão]	21,7 milhões [19,1 milhões–22,6 milhões]

* Estimativas por crianças não foram publicadas por causa dos números baixos.

Terapia antirretroviral regional —2017

	Porcentagem de mulheres grávidas com acesso a medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão vertical de HIV	Porcentagem de adultos (idade 15+) vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de crianças (idade 0–14) vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de pessoas vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral (total)
África Oriental Austral	93% [73–>95%]	66% [52–77%]	59% [45–77%]	66% [52–>77%]
Ásia e Pacífico	56% [43–74%]	53% [37–71%]	71% [53–>95%]	53% [37–72%]
África Oriental e Central	48% [32–65%]	41% [26–57%]	26% [17–38%]	40% [25–55%]
América Latina	73% [58–90%]	61% [43–80%]	55% [39–75%]	61% [43–79%]
Caribe	75% [58–95%]	58% [42–80%]	52% [39–80%]	57% [42–80%]
Oriente Médio e Norte da África	22% [15–32%]	29% [17–43%]	35% [25–47%]	29% [17–43%]
Leste Europeu e Ásia Central	—*	35% [28–40%]	—*	36% [29–41%]
Europa Ocidental e Central América do Norte	—*	78% [60–90%]	—*	78% [60–90%]
Global	80% [61–>95%]	59% [44–73%]	52% [37–70%]	59 [44–73%]

* Estimativas por crianças não foram publicadas por causa dos números baixos.

Contato

UNAIDS no Brasil: Daniel de Castro | tel (61) 3038 9221 | decastrod@unaids.org Dados adicionais disponíveis em unaids.org.br (em português), unaids.org (dados completos em inglês) e aidsinfo.unaids.org