DIA MUNDIAL CONTRA A AIDS
1º DEZEMBRO 2018
HOMENAGEANDO 30 ANOS

RELATÓRIO INFORMATIVO – DIA MUNDIAL CONTRA A AIDS 2018

ESTATÍSTICAS GLOBAIS SOBRE HIV 2017

36,9 milhões [31,1 milhões–43,9 milhões] de pessoas em todo o mundo viviam com HIV em 2017.

21,7 milhões [19,1 milhões–22,6 milhões] de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral em 2017.

1,8 milhão [1,4 milhão–2,4 milhões] de novas infecções pelo HIV em 2017.

940.000 [670.000–1,3 milhão] de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS em 2017.

77,3 milhões [59,9 milhões–100 milhões] de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia.

35,4 milhões [25,0 milhões–49,9 milhões] de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS desde o início da epidemia.

Pessoas vivendo com HIV

- Em 2017, havia 36,9 milhões [31,1 milhões–43,9 milhões] de pessoas vivendo com HIV.
  - 35,1 milhões [29,6 milhões–41,7 milhões] de adultos.
  - 1,8 milhão [1,3 milhão–2,4 milhões] de crianças (menores de 15 anos).
- 75% [55–92%] de todas as pessoas vivendo com HIV conheciam seu estado sorológico.
- Cerca de 9,4 milhões de pessoas não sabem que vivem com HIV.

Pessoas vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral

- Em 2017, 21,7 milhões [19,1 milhões–22,6 milhões] de pessoas vivendo com HIV tinham acesso à terapia antirretroviral, um aumento dos 8 milhões [7,1 milhões–8,3 milhões] em 2010.
- 59% [44–73%] de todas as pessoas vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento.
  - 59% [44–73%] dos adultos com 15 ou mais anos vivendo com HIV tinham acesso ao tratamento, assim como 52% [37–70%] das crianças de 0 a 14 anos.
  - 65% [49-80%] das mulheres com idade igual ou superior a 15 anos tiveram acesso ao tratamento de HIV, mas apenas 53% [38-66%] dos adultos do sexo masculino com 15 anos ou mais tiveram acesso ao tratamento.
- Em 2017, 80% [61–>95%] das mulheres grávidas vivendo com HIV tinham acesso a medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão do HIV para seus bebês.

Novas infecções por HIV

- O número de novas infecções por HIV caiu 47% desde o pico em 1996.
  - Em 2017, houve 1,8 milhão [1,4 milhão–2,4 milhões] de novas infecções por HIV, em comparação com 3,4 milhões [2,6 milhões–4,4 milhões] em 1996.
- Desde 2010, as novas infecções por HIV entre adultos caíram cerca de 16%, de 1,9 milhão [1,5 milhão–2,5 milhões] para 1,6 milhão [1,3 milhão–2,1 milhões] em 2017.
  - Desde 2010, as novas infecções por HIV entre crianças diminuíram 35%, de 270.000 [170.000–400.000] em 2010 para 180.000 [110.000–260.000] em 2017.

Mortes relacionadas à AIDS

- As mortes relacionadas à AIDS caíram mais de 51% desde o pico em 2004.
  - Em 2017, aproximadamente 940.000 [670.000–1,3 milhão] de pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS em todo o mundo, em comparação com 1,9 milhão [1,4 milhão–2,7 milhões] em 2004 e 1,4 milhão [1 milhão–2 milhões] em 2010.

90–90–90

- Em 2017, três em cada quatro pessoas vivendo com HIV (75%) conheciam seu estado sorológico para o HIV (foram testadas para HIV).
- Entre as pessoas que conheciam seu estado sorológico, quatro a cada cinco (79%) tinham acesso ao tratamento antirretroviral.
- Entre as pessoas com acesso ao tratamento, quatro a cada cinco (81%) tinham carga viral suprimida.
- 47% de todas as pessoas vivendo com HIV têm a carga viral suprimida.

Mulheres

- Todas as semanas, cerca de 7.000 mulheres jovens entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV.
  - Na África Subsaariana, três a cada quatro novas infecções são entre meninas com idade entre 15 e 19 anos. Mulheres jovens entre 15 e 24 anos têm o dobro de probabilidade de estarem vivendo com HIV do que homens.
- Mais de um terço (35%) das mulheres em todo o mundo sofreram violência física e/ou sexual em algum momento de suas vidas.
  - Em algumas regiões, as mulheres que sofrem violência são 1,5 vez mais sucetíveis a se infectarem pelo HIV.

Populações-chave

- Populações-chave e seus parceiros sexuais representam:
  - 47% das novas infecções pelo HIV em todo o mundo.
  - 95% das novas infecções pelo HIV no Leste Europeu e Ásia Central e no Oriente Médio e Norte da África.
  - 16% das novas infecções pelo HIV na África Oriental e Austral.

- O risco de infecção pelo é:
  - 27 vezes maior entre homens que fazem sexo com homens.
  - 23 vezes maior entre pessoas que usam drogas injetáveis.
  - 13 vezes maior entre profissionais do sexo.
  - 13 vezes maior entre mulheres trans.

HIV/Tuberculose (TB)

- A tuberculose continua a ser a principal causa de morte entre pessoas vivendo com HIV, e é resonsável por cerca de uma a cada três mortes relacionas à AIDS.
- Em 2016, 10,4 milhões de pessoas desenvolveram TB, incluindo 1,2 milhão de pessoas vivendo com HIV.
  - Pessoas vivendo com HIV sem sintomas de TB precisam de terapia preventiva contra TB, que contribui para diminuir o risco de desenvolver TB e reduz as taxas de mortalidade por TB/HIV em cerca de 40%.
- Estima-se que 49% das pessoas que vivem com HIV e tuberculose desconhecem sua coinfecção e, portanto, não estão recebendo cuidados.

Investimentos

- No final de 2017, US$ 21,3 bilhões estavam disponívies para a resposta à AIDS em países de baixa e média renda.
  - Os recursos domésticos constituíram cerca de 56% dos recursos totais para o HIV em países de baixa e média renda em 2017.
- O UNAIDS estima que será necessário um investimento de US$ 26,2 bilhões para a resposta à AIDS até 2020.

Dados Globais

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoas vivendo com HIV	**27,4 milhões** [23,1 milhões–32,6 milhões]	**30,1 milhões** [25,4 milhões–35,8 milhões]	**32,4 milhões** [27,4 milhões–38,5 milhões]	**33,7 milhões** [28,4 milhões–40,0 milhões]	**34,3 milhões** [29,0 milhões–40,8 milhões]	**35,0 milhões** [29,5 milhões–41,6 milhões]	**35,6 milhões** [30,1 milhões–42,4 milhões]	**36,3 milhões** [30,6 milhões–43,1 milhões]	**36,9 milhões** [31,1 milhões–43,9 milhões]
Novas infecções por HIV (total)	**2,8 milhões** [2,2 milhão–3,7 milhões]	**2,5 milhões** [1,9 milhão–3,2 milhões]	**2,2 milhões** [1,7 milhão–2,9 milhões]	**2,1 milhões** [1,6 milhão–2,7 milhões]	**2,0 milhões** [1,6 milhão–2,7 milhões]	**2,0 milhões** [1,5 milhão–2,6 milhões]	**1,9 milhão** [1,5 milhão–2,5 milhões]	**1,9 milhão** [1,4 milhão–2,4 milhões]	**1,8 milhão** [1,4 milhão–2,4 milhões]
Novas infecções por HIV (com idade 15+)	**2,4 milhões** [1,9 milhão–3,2 milhões]	**2,1 milhões** [1,6 milhão–2,7 milhões]	**1,9 milhão** [1,5 milhão–2,5 milhões]	**1,8 milhão** [1,4 milhão–2,4 milhões]	**1,8 milhão** [1,4 milhão–2,4 milhões]	**1,8 milhão** [1,4 milhão–2,3 milhões	**1,7 milhão** [1,3 milhão–2,3 milhões]	**1,7 milhão** [1,3 milhão–2,2 milhões]	**1,6 milhão** [1,3 milhão–2,1 milhões]
Novas infecções por HIV (com idade 0–14)	**420 000** [260 000–620 000]	**380 000** [240 000–560 000]	**270 000** [170 000–400 000]	**230 000** [150 000–340 000]	**220 000** [140 000–320 000]	**200 000** [120 000–290 000]	**190 000** [120 000–280 000]	**180 000** [110 000–270 000]	**180 000** [110 000–260 000]
Mortes relacionadas à AIDS	**1,5 milhão** [1,1 milhão–2,2 milhões]	**1,9 milhão** [1,4 milhão–2,7 milhões]	**1,4 milhão** [1,0 milhão–2,0 milhões]	**1,2 milhão** [880 000–1,7 milhão]	**1,2 milhão** [820 000–1,6 milhão]	**1,1 milhão** [770 000–1,5 milhão]	**1,0 milhão** [730 000–1,5 milhão]	**990 000** [700 000–1,4 milhão]	**940 000** [670 000–1,3 milhão]
Pessoas com acesso à terapia antirretroviral	**611 000** [538 000–636 000]	**2,1 milhões** [1,8 milhão–2,1 milhões]	**8,0 milhões** [7,1 milhões–8,3 milhões]	**11,4 milhões** [10,1 milhões–11,9 milhões]	**13,2 milhões** [11,6 milhões–13,8 milhões]	**15,1 milhões** [13,3 milhões–15,7 milhões]	**17,2 milhões** [15,2 milhões–17,9 milhões]	**19,4 milhões** [17,1 milhões–20,2 milhões]	**21,7 milhões** [19,1 milhões–22,6 milhões]
Recursos disponíveis para HIV (países de baixa - e média - renda)	**US$ 4,8 bilhões***	**US$ 9,4 bilhões***	**US$ 15,9 bilhões***	**US$ 18,8 bilhões***	**US$ 19,5 bilhões****	**US$ 19,2 bilhões****	**US$ 19,0 bilhões****	**US$ 19,1 bilhões****	**US$ 21,3 bilhões****

* Inclui países classificados como baixa - e média - renda pelo Banco Mundial na classificação de 2012.
** Inclui países de baixa - e média - renda pelo Banco Mundial na classificação de 2013.

Dados Regionais—2017

Região	Pessoas vivendo com HIV 2017	Novas infecções 2017			Mortes relacionadas à AIDS 2017	Pessoas com acesso ao tratamento 2017
		Total	Idade 15+	Idade 0–14		
África Oriental e Austral	**19,6 milhões** [17,5 milhões–22,0 milhões	**800 000** [650 000–1,0 milhão]	**710 000** [580 000–890 000]	**92 000** [61 000–130 000]	**380 000** [300 000–510 000]	**12,9 milhões [11,4 milhões–13,4 milhões]**
Ásia e Pacífico	**5,2 milhões** [4,1 milhões–6,7 milhões]	**280 000** [210 000–390 000]	**280 000** [210 000–390 000]	**10 000** [7 400–14 000]	**170 000** [110 000–280 000]	**2,7 milhões [2,4 milhões–2,9 milhões]**
África Ocidental e Central	**6,1 milhões** [4,4 milhões–8,1 milhões]	**370 000** [220 000–570 000]	**310 000** [180 000–470 000]	**67 000** [36 000–100 000]	**280 000** [180 000–410 000]	**2,4 milhões [2,1 milhões–2,5 milhões]**
América Latina	**1,8 milhão** [1,5 milhão–2,3 milhões]	**100 000** [77 000–130 000]	**99 000** [75 000–130 000]	**2400** [1800–3600]	**37 000** [26 000–51 000]	**1,1 milhão [992 000–1,2 milhão]**
Caribe	**310 000** [260 000–420 000]	**15 000** [11 000–26 000]	**14 000** [10 000–24 000]	**1100** [710–1 900]	**10 000** [7 100–17 000]	**181 000 [159 000–188 000]**
Oriente Médio e Norte da África	**220 000** [150 000–300 000]	**18 000** [10 000–31 000]	**17 000** [9 200–28 000]	**1 300** [780–1 900]	**9 800** [6 400–15 000]	**63 200 [55 600–65 700]**
Leste Europeu e Ásia Central	**1,4 milhão** [1,3 milhão–1,6 milhão]	**130 000** [120 000–150 000]	**130 000** [120 000–150 000]	—*	**34 000** [25 000–41 000]	**520 000 [458 000–541 000]**
Europa Ocidental e Central e América do Norte	**2,2 milhões** [1,9 milhão–2,4 milhões]	**70 000** [57 000–84 000]	**69 000** [57 000–83 000]	—*	**13 000** [9 900–18 000]	**1,7 milhão [1,5 milhão–1,8 milhão]**
Total Global	**36,9 milhões** [31,1 milhões–43,9 milhões]	**1,8 milhão** [1,4 milhão-2,4 milhões]	1.6 milhão [1.3 milhão–2.1 milhão]	180 000 [110 000–260 000]	940 000 [670 000–1.3 milhão]	**21,7 milhões [19.1 milhões–22.6 milhões]**

* Estimativas por crianças não foram publicadas por causa dos números baixos.

Terapia antirretroviral regional —2017

	Porcentagem de mulheres grávidas com acesso a medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão vertical de HIV	Porcentagem de adultos (idade 15+) vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de crianças (idade 0–14) vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de pessoas vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral (total)
África Oriental Austral	93% [73–>95%]	66% [52–77%]	59% [45–77%]	66% [52–>77%]
Ásia e Pacífico	56% [43–74%]	53% [37–71%]	71% [53–>95%]	53% [37–72%]
África Oriental e Central	48% [32–65%]	41% [26–57%]	26% [17–38%]	40% [25–55%]
América Latina	73% [58–90%]	61% [43–80%]	55% [39–75%]	61% [43–79%]
Caribe	75% [58–95%]	58% [42–80%]	52% [39–80%]	57% [42–80%]
Oriente Médio e Norte da África	22% [15–32%]	29% [17–43%]	35% [25–47%]	29% [17–43%]
Leste Europeu e Ásia Central	—*	35% [28–40%]	—*	36% [29–41%]
Europa Ocidental e Central América do Norte	—*	78% [60–90%]	—*	78% [60–90%]
Global	80% [61–>95%]	59% [44-73%]	52% [37-70%]	59 [44-73%]

* Estimativas por crianças não foram publicadas por causa dos números baixos.

Contato
UNAIDS no Brasil: Daniel de Castro | tel (61) 3038 9221 | decastrod@unaids.org Dados adicionais disponíveis em unaids.org.br (em português), unaids.org (dados completos em inglês) e aidsinfo.unaids.org