

TUBERCULOSE E HIV

EM 2017, 10 MILHÕES DE PESSOAS ADOECERAM DE TUBERCULOSE E 1,6 MILHÃO MORRERAM DEVIDO À TB



Pessoas que vivem com HIV têm **21 vezes** mais chances de desenvolver doenças **da TB**

O FINANCIAMENTO GLOBAL ANUAL PARA TB TEM **US\$ 2.3 BILHÕES** AMENOS DO QUE O NECESSÁRIO



A TB É A **PRINCIPAL CAUSA DE MORTE** ENTRE PESSOAS VIVENDO COM HIV

UNAIDS

ESTÁ TRABALHANDO COM PARCEIROS PARA REDUZIR AS MORTES POR TUBERCULOSE ENTRE PESSOAS VIVENDO COM HIV

EM 75% ATÉ 2020



Em 2017, cerca de 300.000 pessoas morreram por TB relacionada à AIDS

TB É CURÁVEL:
54 MILHÕES
DE VIDAS
FORAM SALVAS
DESDE 2000

PROGRAMAS DE HIV/TB SIMPLES, ACESSÍVEIS E EFICAZES

Todas as pessoas que vivem com HIV devem ter acesso à:

- Terapia antirretroviral
- Diagnóstico e tratamento para TB
- Triagem regular de TB
- Tratamento preventivo de TB (se não houver sintomas de TB)



Todas as pessoas que vivem com TB devem ter acesso à:

- Testagem para o HIV e terapia antirretroviral
- Tratamento de TB
- Opções de prevenção ao HIV