

RELATORIO INFORMATIVO - DIA MUNDIAL CONTRA A AIDS 2019

ESTATÍSTICAS GLOBAIS SOBRE HIV

24,5 milhões [21,6 milhões—25,5 milhões] de pessoas com acesso à terapia antirretroviral (até o final de junho de 2019).

37,9 milhões [32,7 milhões—44,0 milhões] de pessoas em todo o mundo vivendo com HIV.

1,7 milhão [1,4 milhão—2,3 milhões] de novas infecções por HIV.

770 000 [570 000—1,1 milhão] de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS.

74,9 milhões [58,3 milhões—98,1 milhões] de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia.

32 milhões [23,6 milhões—43,8 milhões] de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia.

Pessoas vivendo com HIV

- Em 2018, havia 37,9 milhões [32,7 milhões—44,0 milhões] de pessoas vivendo com HIV.
 - 36,2 milhões [31,3 milhões– 42,0 milhões] de adultos.
 - 1,7 milhão [1,3 milhão-2,2 milhões] de crianças (menos de 15 anos).
- 79% [67–92%] de todas as pessoas vivendo com HIV conheciam seu estado sorológico positivo para HIV.
- Cerca de 8,1 milhões de pessoas não sabiam que estavam vivendo com HIV.

Pessoas vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral

- Até o fim de junho de 2019, 24,5 milhões [21,6 milhões—25,5 milhões] de pessoas vivendo com HIV tinham acesso à terapia antirretroviral
- Em 2018, 23,3 milhões [20,5 milhões—24,3 milhões] de pessoas vivendo com HIV tinham acesso à terapia antirretroviral, mais do que 7,7 milhões [6,8 milhões—8,0 milhões] em 2010.
- Em 2018, 62% [47–74%] de todas as pessoas vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento.
 - 62% [47–75%] dos adultos com 15 ou mais anos vivendo com HIV tinham acesso ao tratamento, assim como 54% [37–73%] das crianças de 0 a 14 anos.
 - 68% [52-82%] das mulheres com 15 ou mais anos tinham acesso ao tratamento. Entretanto, apenas 55% [41-68%] dos homens com 15 ou mais anos tinham acesso.
- 82% [62->95%] das mulheres grávidas vivendo com HIV tinham acesso a medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão do HIV para seus bebês em 2018.

Novas infecções por HIV

Novas infecções por HIV foram reduzidas em 40% desde o pico em 1997.

- Em 2018, cerca de 1,7 milhão [1,4 milhão—2,3 milhões] de novas infecções por HIV, em comparação com 2,9 milhões [2,3 milhões—3,8 milhões] em 1997.
- Desde 2010, as novas infecções por HIV diminuíram cerca de 16%, de 2,1 milhões
 [1,6 milhão—2,7 milhões] para 1,7 milhão [1,4 milhão—2,3 milhões] em 2018.
 - Desde 2010, novas infecções por HIV entre crianças diminuíram em 41%, de 280 000 [190 000—430 000] em 2010 para 160 000 [110 000—260 000] em 2018.

Mortes relacionadas à AIDS

- As mortes relacionadas à AIDS foram reduzidas em mais de 55% desde o pico em 2004.
 - Em 2018, cerca de 770 000 [570 000—1,1 milhão] de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS em todo o mundo, em comparação com 1,7 milhão [1,3 milhão—2,4 milhões] em 2004 e 1,2 milhão [860 000—1,6 milhão] em 2010.
- A mortalidade relacionada à AIDS diminuiu 33% desde 2010.

90-90-90

- Em 2018, 79% [67-92%] das pessoas vivendo com HIV estavam diagnosticadas e conheciam seu estado sorológico positivo para HIV.
- Entre as pessoas diagnosticadas com HIV, 78% [69—82%] tinham acesso ao tratamento.
- Entre as pessoas com acesso ao tratamento, 86% [72—92%] tinham carga viral suprmida ou indetectável.
- De todas as pessoas que vivem com HIV, 79% [67—92%] conheciam seu diagnóstico positivo, 62% [47—74%] tinham acesso ao tratamento e 53% [43—63%] estavam com carga viral suprimida ou indetectável em 2018.

Mulheres

- Todas as semanas, cerca de 6.000 jovens entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV.
 - Na África Subsaariana, quatro em cada cinco novas infecções entre adolescentes de 15 a 19 anos acontecem em meninas. Mulheres jovens com idade entre 15 e 24 anos têm duas vezes mais chances de viver com o HIV do que os homens.
- Mais de um terço (35%) das mulheres em todo o mundo sofreram violência física e/ou sexual em algum momento de suas vidas.
 - Em algumas regiões, as mulheres que sofreram violência física ou sexual por parceiro íntimo têm 1,5 vez mais probabilidade de contrair o HIV do que as mulheres que não tiveram essa violência.

Populações-chave

- As populações-chave e seus parceiros sexuais representam:
 - 54% das novas infecções por HIV em todo o mundo.
 - Mais de 95% das novas infecções por HIV na Europa do Leste e na Ásia Central.
 - 95% das novas infecções por HIV no Oriente Médio e Norte da África.
 - 88% das novas infecções por HIV na Europa Ocidental e Central e na América do Norte.

- 78% das novas infecções por HIV na Ásia e no Pacífico.
- 65% das novas infecções por HIV na América Latina.
- 64% das novas infecções por HIV na África Ocidental e Central.
- 47% das novas infecções por HIV no Caribe.
- 25% das novas infecções por HIV na África Oriental e Austral.
- O risco de infecção por HIV é:
 - 22 vezes maior entre homens que fazem sexo com homens.
 - 22 vezes maior entre pessoas que usam drogas injetáveis.
 - 21 vezes maior para trabalhadoras do sexo.
 - 12 vezes maior para pessoas transexuais.

HIV/Tuberculose (TB)

- A TB continua a ser a principal causa de morte entre as pessoas que vivem com o HIV, sendo responsável por cerca de uma em cada três mortes relacionadas à AIDS.
- Em 2017, cerca de 10 milhões [9.0—11.1 milhões] pessoas desenvolveram a doença da tuberculose, aproximadamente 9% estavam vivendo com o HIV.
 - Pessoas vivendo com HIV sem sintomas de TB precisam de terapia preventiva de TB, o que diminui o risco de desenvolver TB e reduz as taxas de mortalidade de TB/HIV em cerca de 40%.
- Estima-se que 49% das pessoas que vivem com HIV e tuberculose desconhecem sua coinfecção e, portanto, não estão recebendo cuidados.

Investimentos

- No final de 2018, US\$ 19 bilhões (dólares constantes de 2016) estavam disponíveis para a resposta à AIDS em países de baixa e média renda, quase 1 bilhão a menos que em 2017.
 - Cerca de 56% do total de recursos para o HIV em países de baixa e média renda em 2018 eram de fontes domésticas.
- O UNAIDS estima que serão necessários US\$ 26,2 bilhões (dólares constantes de 2016) para a resposta à AIDS em 2020.

Dados Globais

	2000	2005	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Pessoas vivendo com HIV	24,9 milhões [21,5 milhões– 28,9 milhões]	28,5 milhões [24,5 milhões– 33,0 milhões]	31,7 milhões [27,3 milhões– 36,8 milhões]	33,2 milhões [28,7 milhões– 38,6 milhões]	34,8 milhões [30,0 milhões– 40,4 milhões]	35,6 milhões [30,7 milhões– 41,3 milhões]	36,4 milhões [31,4 milhões– 42,3 milhões]	37,2 milhões [32,1 milhões–43,2 milhões]	37,9 milhões [32,7 milhões– 44,0 milhões]
Novas infecções por HIV (total)	2,8 milhões [2,2 milhões– 3,6 milhões]	2,4 milhões [1,9 milhão– 3,2 milhões]	2,1 milhões [1,6 milhão– 2,7 milhões]	2,0 milhões [1,5 milhão– 2,6 milhões]	1,9 milhão [1,5 milhão– 2,5 milhões]	1,9 milhão [1,5 milhão– 2,4 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão– 2,4 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão– 2,3 milhões]	1,7 milhão [1,4 milhão– 2,3 milhões]
Novas infecções por HIV (com idade 15+)	2,3 milhões [1,8 milhão– 3,1 milhões]	2,0 milhões [1,6 milhão– 2,6 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão– 2,4 milhões]	1,8 milhão [1,4 milhão– 2,3 milhões]	1,7 milhão [1,3 milhão– 2,2 milhões]	1,7 milhão [1,3 milhão– 2,2 milhões]	1,7 milhão [1,3 milhão— 2,2 milhões]	1,6 milhão [1,3 milhão– 2,1 milhões]	1,6 milhão [1,2 milhão– 2,1 milhões]
Novas infecções por HIV (com idade 0–14)	450 000 [300 000–700 000]	410 000 [270 000–640 000]	280 000 [190 000– 430 000]	230 000 [150 000– 350 000]	200 000 [130 000– 310 000]	190 000 [120 000– 290 000]	180 000 [120 000– 280 000]	170 000 [110 000– 270 000]	160 000 [110 000– 260 000]
Mortes relacionadas à AIDS	1,4 milhão [1,0 milhão– 1,9 milhão]	1,7 milhão [1,3 milhão– 2,3 milhões]	1,2 milhão [860 000– 1,6 milhão]	1,0 milhão [770 000– 1,4 milhão]	920 000 [680 000– 1,3 milhão]	880 000 [650 000– 1,2 milhão]	840 000 [620 000– 1,1 milhão]	800 000 [600 000– 1,1 milhão]	770 000 [570 000– 1,1 milhão]
Pessoas com acesso à terapia antirretroviral	576 000 [507 000–599 000]	2,0 milhões [1,8 milhão– 2,1 milhões]	7,7 milhões [6,8 milhões– 8,0 milhões]	11,2 milhões [9,9 milhões– 11,7 milhões]	15,1 milhões [13,3 milhões– 15,7 milhões]	17,0 milhões [15,0 milhões– 17,7 milhões]	19,1 milhões [16,8 milhões– 19,9 milhões]	21,3 milhões [18,8 milhões– 22,2 milhões]	*24,5 milhões (meio de 2019)/ 23,3 milhões [20,5 milhões–24,3 milhões]
Recursos disponíveis para HIV (países de baixa - e média - renda	US\$ 4.8 bilhões**	US\$ 9.4 bilhões**	US\$ 15.0 bilhões**	US\$ 17.4 bilhões**	US\$ 18.1 bilhões***	US\$ 18.0 bilhões***	US\$ 18.4 bilhões***	US\$ 19.9 bilhões***	US\$ 19.0 bilhões***

Dólares constantes de 2016

Inclui países classificados como baixa - e média - renda pelo Banco Mundial na classificação de 2012.
 Inclui países de baixa - e média - renda pelo Banco Mundial na classificação de 2013.

Dados Regionais—2018

	Pessoas vivendo com	Nov	vas infecções 2	Mortes relacionadas à	Pessoas com acesso		
Região	HIV 2018	Total	Idade 15+	ldade 0–14	AIDS 2017	ao tratamento 2018	
África Oriental e Austral	20,6 milhões [18.2 milhões– 23.2 milhões]	800 000 [620 000– 1.0 milhão	710 000 [550 000– 940 000]	84 000 [57 000– 140 000]	310 000 [230 000–400 000]	13.8 milhões [12.1 milhões– 14.3 milhões]	
Ásia e Pacífico	5.9 milhões [5.1 milhões– 7.1 milhões]	310 000 [270 000– 380 000]	300 000 [260 000– 360 000]	12 000 [9800– 18 000]	200 000 [160 000– 290 000]	3.2 milhões [2.8 milhões– 3.3 milhões]	
África Ocidental e Central	5.0 milhões [4.0 milhões– 6.3 milhões]	280 000 [180 000– 420 000]	220 000 [140 000– 340 000]	58 000 [36 000– 87 000]	160 000 [110 000– 230 000]	2.6 milhões [2.2 milhões– 2.7 milhões]	
América Latina	1.9 milhão [1.6 milhão– 2.4 milhões]	100 000 [79 000– 130 000]	100 000 [77 000– 130 000]	3100 [2100– 4600]	35 000 [25 000–46 000]	1.2 milhão [1.1 milhão– 1.3 milhão]	
Caribe	340 000 [290 000– 390 000]	16 000 [11 000– 24 000]	15 000 [10 000– 22 000]	1100 [660– 1500]	6700 [5100– 9100]	187 000 [164 000– 194 000]	
Oriente Médio e Norte da África	240 000 [160 000– 390 000]	20 000 [8500– 40 000]	18 000 [7700– 37 000]	1500 [710– 2 800]	8400 [4800– 14 000]	78 800 [69 400– 82 000]	
Leste Europeu e Ásia Central	1.7 milhão [1.5 milhão– 1.9 milhão]	150 000 [140 000– 160 000]	150 000 [130 000– 160 000]	_*	38 000 [28 000– 48 000]	648 000 [571 000– 674 000]	
Europa Ocidental e Central e América do Norte	2.2 milhões [1.9 milhão– 2.4 milhões]	68 000 [58 000– 77 000]	68 000 [58 000– 77 000]	_*	13 000 [9400– 16 000]	1.7 milhão [1.5 milhão– 1.8 milhão]	
Total Global	37.9 milhões [32.7 milhões– 44.0 milhões]	1.7 milhão [1.4 milhão- 2.3 milhões]	1.6 milhão [1.2 milhão– 2.1 milhões]	160 000 [110 000– 260 000]	770 000 [570 000– 1.1 milhão]	23.3 milhões [20.5 milhões– 24.3 milhões]	

^{*} Estimativas por crianças não foram publicadas por causa dos números baixos

Terapia antirretroviral regional—2018

	Porcentagem de mulheres grávidas com acesso a medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão vertical do HIV	Porcentagem de adultos (idade 15+) vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de crianças (idade 0– 14) vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral	Porcentagem de pessoas vivendo com HIV com acesso à terapia antirretroviral (total)
África Oriental Austral	92% [69–>95%]	67% [52–78%]	62% [42–82%]	67% [52–78%]
Ásia e Pacífico	56% [47–71%]	54% [41–68%]	78% [57–>95%]	54% [41–68%]
África Oriental e Central	59% [42–78%]	53% [37–69%]	28% [18–39%]	51% [36–66%]
América Latina	76% [61–95%]	63% [44–79%]	48% [34–64%]	62% [44–78%]
Caribe	86% [68–>95%]	56% [42–68%]	42% [29–51%]	55% [42–67%]
Oriente Médio e Norte da Africa	28% [16–47%]	32% [18–54%]	35% [21–53%]	32% [18–54%]
Leste Europeu e Ásia Central	 *	37% [30–43%]	_ *	38% [30–44%]
Europa Ocidental e Central América do Norte	 *	79% [61–92%]	 *	79% [61–92%]
Global	82 % [62–>95%]	62% [47-75%]	54% [37-73%]	62% [47-74%]

^{*} Estimativas por crianças não foram publicadas por causa dos números baixos.

Contato

UNAIDS no Brasil: Daniel de Castro | tel (61) 3038 9221 | decastrod@unaids.org Dados adicionais disponíveis aidsinfo.unaids.org