


TUBERCULOSE E HIV

IN 2022, ESTIMA-SE QUE 10,6 MILHÕES DE PESSOAS TENHAM ADOECIDO COM TUBERCULOSE. 1,3 MILHÃO MORRERAM DA DOENÇA



Pessoas vivendo com HIV têm até **16 [14–18] vezes** mais chances de adoecer **com TB**

FINANCIAMENTO GLOBAL ANUAL PARA DESENVOLVIMENTO E PESQUISA SOBRE TUBERCULOSE É **US\$ 1 BILHÃO** ABAIXO DO NECESSÁRIO



TB É A PRINCIPAL CAUSA DE MORTE ENTRE PESSOAS VIVENDO COM HIV

UNAIDS ESTÁ TRABALHANDO

COM PARCERIAS PARA REDUZIR AS MORTES RELACIONADAS À TB ENTRE PESSOAS VIVENDO COM HIV EM **80%** (EM COMPARAÇÃO COM OS DADOS DE 2010) E GARANTIR QUE **90%** DAS PESSOAS RECEBAM TRATAMENTO PREVENTIVO PARA TUBERCULOSE ATÉ 2025.



A TB é curável: a combinação do tratamento para TB e terapia antirretroviral (ART) evitou aproximadamente **6,4 milhões de mortes** entre 2010 e 2022.

Em 2022, estima-se que apenas **54%** das pessoas vivendo com HIV e que desenvolveram tuberculose receberam tratamento tanto para tuberculose quanto a terapia antirretroviral (ART).

GLOBALMENTE, **11,3 MILHÕES** PESSOAS VIVENDO COM HIV RECEBERAM TRATAMENTO PREVENTIVO PARA TB **ENTRE 2018 E 2022**

EM 2022, ESTIMA-SE QUE **170 MIL** PESSOAS MORRERAM DE TB RELACIONADA À AIDS

PROGRAMAS SIMPLES, ACESSÍVEIS E EFICAZES PARA HIV/TB

Todas as pessoas vivendo com HIV devem ter acesso a:

- Terapia Antirretroviral
- Diagnóstico e tratamento para TB
- Exames regulares para tb
- Terapia preventiva para TB (mesmo sem sintomas)



Todas as pessoas vivendo com TB devem ter acesso a:

- Teste de HIV e terapia antirretroviral
- Tratamento para TB
- Opções de prevenção do HIV